

DISSERTATIO INAUGURALIS

DE

CYSTITIDE;

QUAM,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE REVERENDI ADMODUM VIRI,

D. GEORGII BAIRD, SS. T. P.

ACADEMIÆ EDINBURGENÆ PRÆFECTI;

NECNON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU,

ET NOBILISSIMÆ FACULTATIS MEDICÆ DECRETO;

Pro Gradu Doctoris,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS,

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

COLINUS SIEVWRIGHT,

SCOTO-BRITANNUS,

IN EXERCITU BRITANNICO CHIRURGUS.

Calend. Aug. horâ locoque solitis.

EDINBURGI:

EXCUDEBANT JAC. BALLANTYNE ET SOCIJ.

1815.

DISSERTATIO INAUGURALIS

DE

CYSTITIDE

QUAM

LAUREA MEDICAE

ET AGGREGATIONE REVERENDI LONDONENSIS

D. GEORGIUS GILLIES, M.D.

ACADEMIAE LONDONENSIS PRÆSENTAT

JOHANNI GILLIES, M.D.

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

LIBRIS ET DOCTRINA

ET MUSEI HISTORIAE NATURALIS MUSEI HISTORIAE

INSIGNI

1910



REPERTORIUM IN MEDICIS

LIBRIS ET DOCTRINA

CONSERVANTIA ET

REPERTORIUM IN MEDICIS

COLLIGIT

SCOTT

D. T. 1910

IN REPERTORIUM BRITANICUM

Calcutta, Aug. 1910

INDICIBUS

REPERTORIUM IN MEDICIS

1815

CELEBERRIMO VIRO,
JOANNI GILLIES, L. L. D.

LITERIS ET DOCTRINA

INSIGNI,

HOC OPUSCULUM,

OBSERVANTIÆ ET GRATI ANIMI

PIGNUS,

D. D. CQUE

AUCTOR.

ROBERTO SPEID,

ARMIGERO,

DE ARDOVIE,

VIRO,

OMNIBUS VIRTUTIBUS,


PRÆDITO,

HOC,

AMICITIÆ TESTIMONIUM,

OFFERT,

COLINUS SIEVWRIGHT.



Digitized by the Internet Archive
in 2020 with funding from
Wellcome Library

DISSERTATIO
JOSEPHO LOWE, M. D.

AVO MEO CARISSIMO,

PIETATIS TESTIMONIUM,

HOC PRIMUM IN MEDICINA TENTAMEN

SACRUM

VULT,

COLINUS SIEVWRIGHT.

DISSERTATIO
22
INAUGURALIS
DE CYSTITIDE.

AUCTORE COLINO SIEVWRIGHT.

HUMANI corporis nullum est organum, cujus, morbi, functiones systematis magis perturbant, quam vesica urinaria. Neque ulla est pars quam haecce, quæ alias laesas esse, plenius clariusque ostendit. Rebus ità sese habentibus, omnes medici peritissimi, a primis medicæ scientiæ originibus, usque ad tempora hodierna celeberrima, animos condi-

tioni urinæ quam maxime potuerunt, semper dederunt; et hæc res eandem esse summi momenti sine dubio probat. Numerus morborum quibus hocce organum delicatissimum obnoxium est, æque ac consensus inter omnes corporis partes, tum medici, tum Chirurgi attentionem jure sibi vindicat. Nulla etenim morborum classis est, quibus illius scientia, hujusve solertia, ad symptomata affectiones urinarias semper sequentia removenda, per necessaria sunt. Neque affectionum organi hujusce ulla est, quæ majus periculum, doloremque angentem inter progressum adfert, et quæ sequentia pejora necessariò reddit quam Cystitis, sive vesicæ inflammatio. Hunc in morbum gravissimum, mentem meam sedulò incubui, quia mihi ad plurima ejusdem exempla observanda de quibus postea mentionem plenius faciam, haud rarò contigit.

Quum Cystitis forma in Idiopathica minimè saepe sese ostendat, et quum auctores

chirurgici eundem morbum symptomaticum tantùm cogitaverint, hicce, a plurimis medicis summo cum silentio omninò præteritur.

HISTORIA MORBI.

Cystitis a Culleno Celeberrimo ità definitur. “ Pyrexia, Hypogastrii tensio et dolor ; mictio frequens dolorifica vel Ischuria, Tenesmus.”

Pyrexia quæ Cystitidem sequitur, ei, quæ in inflammationibus visceralibus generatim tenetur, simillima est. Pulsus, facie adhuc floridâ, et parvus et durus ; calorque in cutis superficiem, quæ et sicca et arida restat, immodicus est. Humor, nihilominus, miseriis aegroti minimè imminutis, plus ex dolore angente, quam ex eventu felici oriens, nonnunquam sese ostendit. Aeger, tum comate, tum stupore, tum capitis dolore immodico,

tum vertigine, linguâ et alba, et foeda, et sicca, et arida existente, haud rarò laborat. Ab initio morbi, rigores iis similes ex partium internarum suppuratione orientibus, siti immodica simul invadente, gustuque singulari urinario in ore existente, in miserrimum saepè impetum faciunt. Magnâ quoque æger pro acidis liquoribus cupiditate, cui si pareat, dolores suos valdè adauget, tenetur. Sanguis detractus, si frigescere liceret, coriaceam albam, ut aliis in affectionibus inflammatoriis, ne quidem ab initio morbi tam multùm ostendit. Tumor, præcipuè horis aliquibus ex morbi impetu elapsis, in regionem Hypogastricam, cui dolores angentes adsunt, observatur. Nihilominùs in memoria tenendum esset, eundem spe minorem sæpe evadere. Vesica enim, aut urinæ secretionem redacta, aut orificiis uriterum ab inflammatione clausis, aut tunica musculari vesicæ ipsius valde contracta, distentionem facillè minimè patitur.

Dolor, pressurâ tumori adhibitâ major fit ;
exteriùs ad inguina, sursùmque, ad renes,
uriteres sequens, cursum dirigit. Ureteres
et renes nisi valdè affectæ sint, testes retrac-
tione minore, quam in Nephritide tenentur ;
atque stupor et dolor secundum femur, minùs
inquietis adferunt. Multum doloris, nihilo-
minus, in cursu urethræ atque ad penis ex-
tremum, cupiditate præputii protrahendi in-
vadente, adest. Dolores, autem, finibus supra
dictis minime teneri, sed totum abdomen
pervadere, formamque colicorum sæpè assu-
mere, memoria dignum est. Æger, urinam
reddere raro potest ; cupiditas mictionis ni-
hilo minùs maxime anget, dolorque guttarum
paucarum omnem per urethram quæ liquore
fervente perfundi judicatur, vix ac ne vix
quidem intolerabilis est. Hoc, ex spasmo cer-
vicem vesicæ urethramque invadente, æque
ac ex eorundem inflammatione oriri, ni fallor
mihi videtur. Rebus ità sese habentibus

urina reddita colore croceo gaudet, et sanguine commisceri videtur. Neque hic loci silentio praeteriendum est, Ischuriam dolen-
tissimam, omnibusque remediis, nisi actio in-
flammatoria in vincula injecta esset, repug-
nantem, muco sub morbi finem glutinoso ex
urethra progrediente, sanguine commixto,
sæpissimè invadere. Tenesmus inflammatio-
nem vesicæ semper comitatur, atque dolores,
quam symptomata alia, magis cruciantes, ad-
fert. Rebus ità sese habentibus, aeger, fæcibus
velut in Dysenteria in scybala, ex contrac-
tione tunicæ intestinorum magnorum mus-
cularis orientia, factis, evacuationem alvinam
vix ac ne vix quidem habere potest. Æger
crura sua ad corpus, velut in Herniâ attrahit,
atque quiete, cum in latus recumbat, gaudet.
Neque hic loci alienum observare videtur,
miserrimum positione in erecta sedere mini-
mè saepe posse, atque labores ejus, omnem
inter motum, velut tussim, vomitumque, &c.

impetu a spasmō in musculos abdominales facto, semper augeri. Æger quoque, mentis pathematis deprimentibus, anxietate magnâ, omnem inter motum, opprimente laborat. Rei biliosæ rejectio, desiderio cibi absente, dolore autem ventriculi angente, adest. Neque ullo modo obliviscendum est, sitem, ærunnis miserrimi gravissimis, omnem inter morbum ansam præbere.—Historiam imperfectam, vesicæ inflammationis supra traditam, ex exemplis quæ mihi observare contigit, facere ausus sum, et duo ex his narrare, quam brevissimè potero, memet postea accingam.

TERMINATIO MORBI.

Hic morbus, ut aliæ phlegmasiæ, vel in resolutione, vel in suppuratione, vel in gangræna, terminari potest. Harum omnium suppuratio, ni fallor, multò frequentissima est. Haec terminatio, remissione tum doloris,

tum tensionis partiali, pure cum urina commixto, rigoribus, febreque hectica supervenientibus, cognoscitur. Resolutio et gangræna, per effectus, totum in corpus facillimè discriminantur. Spem autem resolutionis, quadragessimâ horâ elapsâ, nisi urina antea reddita fuisset, fovere inane est. Vir, qui suppurationem post horam sexagintesimam expectat, aquam ex cribro haurit. Sin autem urinæ secretio diminuta esset, et symptomata nimis longè procedissent, inflammatione renum sympathica invadente, minùs periculi, quam si vesica pleniùs distenderetur, adfertur. Exitus autem, de urinæ quantitate, quam vesica tenere potest, perplurimum, sine dubio pendet. Varia enim exempla memoriæ traduntur, in quibus plurimæ fluidi libræ sine injuria teneri possent, alia autem cum libræ singulæ, symptomata imminencia citò protulerint. Schirrositas vesicæ, terminatio Cystitidis nec non habetur. Hæc res, vel apud vesicæ cervicem,

vel apud partem muscularem triangularem, inter cervicem ureterumque orificia, existentem, vel apud glandulam prostatam sese fert.

CAUSÆ.

Vis, in partes vesicæ vicinas, velut vulnera, &c. hujus morbi causa est longè frequentissima. Cystitis, præterea, inflammatione augente ex Gonorrhæa, ex stricturis in urethra, ex schirrositate prostatæ vesicæque cervicis, nec non ex Hæmorrhoidæis, aliisve apud rectum tumoribus, ex fæcibus induratis quoque, ex fistula in ano, affectionibusque dysentericis, originem suam sæpissimè ducit. Acria quoque in corpus assumpta, velut Cantharides æque ac Calculi, hujusce, causæ procul dubio habentur. Neque hic loci obliviscendum est, stricturas uno in exemplo lethales, et amplificationi et sphacelo, in pene, testibus, et ve-

sica ansam praeberere. Cystitis ex vulneribus vesicam ipsam penetrantibus symptomata et pauciora et minùs imminetia quam ex inflammatione aliis in partibus generat. Symptomata gravissima, ex organi supradistentione ut ex eventibus Lithotomicis felicibus apparet, oriuntur. An Cantharides, aliaque acria suos vires, organa in urinaria, vel augenda secretionem, vel dotibus stimulantibus, produnt, aqua mihi hæret. Hic loci, Cystitidem, paralysis sphincteris, æque ac aliæ causæ redditionem urinæ prohibenti adscribendum esse dignum est memoriæ tradere.

DIAGNOSIS.

DIAGNOSIS, sine mora et labore facienda sit. Sedes doloris, et Tumor et Ischuria, et urethræ irritatio, Tenesmusque Cystitidem ex Nephritide facilè distinguunt. In Nephri-

tide, dolor in regiones iliacas sese magis porrigit, aegrotusque crura sua minùs violenter in truncum attrahit. Neque nostræ rei alienum, membrum et paralyti, et stupore minùs laborare, atque in Nephritide, latus unum, morbo teneri, addere videtur. Symptomata supra dicta, deinde, si imò in pectore reposita essent, naturam morbi facillimè ostendent. Pretium operæ mentionem facere nihilominus erit, vel aliquid symptoma generale vel aliquem rerum urinarum morbum chronicum Nephritidi præire; Cystitidem autem vel aliqua ex causa externa evidente, vel ex inflammatione augente plerumque orientem, repente invadere: Quum hic morbus vel a Calculo, vel ab alia re in vesica acri, vel a tumore, præsertim si Ischuria eidem præiret, suam originem ducat, diagnosis, deindè, difficilior fit. Rebus autem ità sese habentibus, a symptomatis præcipuis nostris in consiliis ut dirigamur oportet.

PROGNOSIS.

IN conjiciendo de morbi exitu, partem tam maximi, structuræque delicatissimæ, invadentis; tum causis præeuntibus, tum symptomatis comitantibus, tum progressui morbi, tum effectibus in systema universum, opiniones nostræ haud dubie faciendæ sint. Quum Cystitis, forma idiopathica gaudeat, spem deinde exitûs felicioris, quam si ab ulla re irritante oriretur, sine dubio fovere licet. Rebus enim ità sese habentibus, inflammationem præsentem, in aliis autem causam excitantem, quod quidem saepissimè haud fieri potest, amovere opus est. Si morbus e fonte acrium ingestarum, urinæve retentæ, symptomatis haud violentis, urinaque facillimè detracta flueret, aeger sine dubio victoriam reportabit. Quod si vel Calculi, vel Tumores morbo ansam præbuerint,

exitus infaustus, quum causæ, Inflammatione redacta, adhuc restabunt, expectetur oportet. Nec non dignum memoria est, ut si Cystitis originem ex inflammatione sese extendente haberet, eventum feliciorum, nisi res extraneæ veluti ossis fragmentum, &c. partibus irritationem præbeant, præstolari fas est. His rebus jam jam recensitis, de quibusdam symptomatis faustis memorandi præcipua nunc breviter initium faciam. In primo igitur agmine, doloris remissio, tensionis, febrisque post profluvium urinæ liberum quamvis sanguine commistæ haud dubie ponenda sunt. Mictione liberè et facilè facta, miseræ aegri alis sese procul dubio dabunt. Evacuatio alvi nec non miserrimo solatio est. His rebus suprà dictis, quædam de infaustis breviter addam. Dolores et angentes et durantes, tremores urgentes, sudores frigidi, doloresque totum per abdomen vagantes, plurimus vomitus, singultus, anxietas, nausea, respiratioque

difficilis, apud prima pro certo enumeranda sunt. Haec omnia, procul dubio, doloribus subito cessantibus, facie Hippocratica, pulsuque tum debili, tum intermittente existentibus, sudoribus et frigidis et glutinosis caput ambientibus, mortem instantem miserrimo intentant. Suppuratio autem quum ingressa fuerit, symptomatis imminentibus nihilominus foro cedentibus, urinâque liberiùs redditâ, quod timeatur plus quam satis est, sine dubio erit. Ulcera enim vel sese patendi, febrisque hecticæ excitandæ vel formæ inflammatoriæ assumendæ potestatem habebunt. Quod si suppuratio fines intrâ arctos teneri possit, aditusque eidem in anum obtinetur, systemate tunc temporis haud multum turbato, bene, a medico sperandum est. Sin autem haec eadem, ulla forma vel loco gauderet, ne sphacelatio latiùs porrigens, incursum exitialem faceret, pessimè timeatur, oportet.

RATIO MEDENDI.

CONSILIA medendi tria sunt. 1^{mo}. Medicum, evacuationem urinæ elicere, si ullo modo fieri possit, decet. 2^{ndo}. Inflammationem subigere. 3^{tio}. Causam excitantem amovere, oportet. Haec tria consilia uno eodemque tempore, nam, rem aliam, sine alia adjuvanda, auxilio miserrimo venturam esse, haud nostrum est concipere, quam brevissimè absolvam. Venæsectio, ut aliis in morbis typo inflammatorio gaudentibus, prima in acie, sine dubio esset ; quippe quæ res in systema universum et longiùs et latiùs pollet, atque facilimè peragi potest. Operatio autem, modo paululum diverso, ac aliis in Phlegmasiis, vesica præsertim distentione laborante, facia-
tur, oportet. Dignum quoque memoriæ est, Medicum inflammationem velut localem po-

tius quam generalem habere, atque symptomata generalia, ut ex consensu nervoso inter vesicam aliasque partes orientia, tractare decet. Hoc tempore sine dubio mihi fas erit, theoriis omnibus abjectis, mentionem facere, de re quam mihi observare saepissimè contigit; nempe, venæsectionem in Cystitide magnam, celeriterque factam usque ab initio morbi, debilitatem tum inopinatam, tum lethalem, symptomatis localibus, minùs quam a venæsectione topica, deinde sublevatis, semper creare. Sanguis detractus, atque frigescere permissus, coriaceam albam, ut supra dictum erat, minimè ostendit; atque haec res, me iudice, actionem inflammatoriam, topicam, potius quam generalem, esse, indicat. Quum res ita sese habeant, sanguis, per hirudines, vel perinæo, vel regioni Hypogastricæ applicatas, ni fallor, detrahendus esset. Vena magna ipsius penis, pene ipsa tumefacta, vasisque turgidis, et facilè, et tutò dis-

secari potest. Haec res, tum constrictioni urethrae spasmodicae, tum vesicae ipsae sublevabit. Neque dubitandum est, quin copia sanguinis satis magna, a pene ipsa, fomentationibus calidis ritè, sedulóque, adhibitis, obtineri possit. Quum autem, venæsectionem topicam, bonis lateribus suadeam, meum consilium, venæsectionem generalem parvi pendere, minimè esse sedulóque caveatur. Haec res e contra, et rite, et sine mora peragenda est, cum illius compotes nequaquam esse possimus. Fomentationes quoque, tum in regionem Hypogastricam, tum ad Perinaeum applicatae, constrictioni vesicae, ni fallor, multum auxilii ferent. In omnibus rerum urinarum morbis, applicationes calidas, miserrimo, majori utilitati, quam frigidas esse, quippe quæ res, et spasmum et inflammationem augent, sedulò observavi. Dignum quoque memoria est, res frigidas, hoc in morbo, minimi aestimandas esse; nam hae res, nisi et lon-

gum, et constanter applicatæ (atque hæc eadem, summo sine incommodo haud fieri potest) aegro, auxilio vix, ac ne vix quidem veniunt. Ob has igitur causas, fomentationes calidæ partibus, et cautè et sedulò, et constanter, me iudice adhibendæ sunt. Frigidæ, enim, symptomata, nisi animus me fallit, augent, potiùs quam diminuunt. Si aeger positionem suam mutare velit, illi calidis aquæ vaporibus uti sedenti, quippe quæ res, Tenesum, ut in Dysenteria observatur, haud dubie licet.

Purgantia, venæsectioni hoc in morbo ni fallor remedia secunda sunt. A Medico autem ne res et acres, imasque intestinorum partes præcipue incitantes veluti aloes, &c. adhibeantur, sedulò caveatur. Haec enim ad inflammationem topicam, aequè ac morbum ipsum inducendum proclivia sunt. Neque purgantia salina viribus diureticis prædita, hac in re, nostram commendationem obtinere pos-

sunt. Submurias Hydrargyri, nisi animus sit laevis, omnium in Cystitide purgantium est facile princeps. Hoc remedium, magnis in dosibus ut granorum xii. vel xv., opiique grano uno vel duobus conjunctum, irritationem prohibere oportet. Praeter medicamenta supra dicta, enemata emollientia summo cum fructu juberi possint. Nam haec remedia, haud solum pro purgantibus, sed etiam pro fomentationibus utilia erunt. Ex omnibus supra memoratis, Cantharides nullo modo feliciter praescribi posse, facile constat. Nec Sinapismata, nec ullum aliud Epispasticorum genus miserrimo, hoc morbo laboranti plurimum auxilii ferent.

Diaphoretica quoque, si actio eorundem, diuretica amitteretur, attentione Medici dignissima sunt. Pulvis Ipecacuanhae compositus parvis in dosibus administratus, atque paululo Tartritis Antimonii commixtus, plurimum boni hic loci praestabit. Opium

autem nisi modo supra dicto, præscriptum, quippe quæ res, plurimam sitem, quâ indulgere periculosæ plenum opus aleæ est, crearet, summa ope evitandum est.

Diluentia, me iudice parcè præscribenda sunt ; nam secretionem urinæ augebunt, atque distentionem vesicæ promovebunt. Ad sitim removendam, acetum, succusve limonum in ore brevi retenta, me iudice, plurimum conferent. Cobaïba, Terebinthina Canadensis, et similia, inflammatione urgente, mala sunt remedia. Haec autem, inflammatione tergum vertente, morboque suppurationem excepto, medicamentis cum diureticis commixta, atque cum diluentium abundantia adjuncta et liberè et tutò administrari possunt.

Omnibus Medicamentis, ad inflammationem amovendam inutiliter præscriptis, et præsertim si vesicæ distentio adesset, vel si timor gangrænæ medicum invaderet, puncturâ in vesica ad evacuationem obtinendam opus est.

Hæc punctura, per Rectum, et tutissimè, et facillimè, effici potest.

Si aeger ex morbo tam ancipiti convaluit, omnem intemperantiam, cibumque acrem, per longum evitare opus est. Summam ejus curam autem, tum exercitatio modica, tum cibus facile concoctus, tum canalis alimentariæ conditio, jure sibi vindicant. Res jam dictæ quoque, exemplis suppurationem subcuntibus, reque chirurgica indigentibus, me judice, auxilio venient. Morbus autem, quum Schirrositas suos incursus, signis hostilibus, fecerit, insanabilis videtur. Rebus autem ità sese habentibus, Conium Maculatum, Uvam Ursi, cum Cobaiba et dosibus submuriatis Hydrargyri parvis præscribere licet.

CYSTITIDIS CASUS.

EXEMPLUM I.

PRÆFECTUS, quadraginta annos natus, habitu plethorico, vulnus scloppeticum accepit, quod, injuriam tum vesicæ, tum recto, ferebat. Glandulus plumbeus circiter digiti dimidium supra Symphysin Pubis penetravit, atque paululum supra Anum in obliquum egressus est. Cum omnis urina secreta per Vulnera transierit, nulla symptomata infelicia, vel ex Ischuria vel ex Tensione orientia, sed omnia alia antea memorata, sese signatè ostendebant. Oleum Ricini, ore adhibitum, per vulnus transiens, scrupulos omnes de Recti Injuria in fugam celeriter vertit. Catheterem in vesicam emittere, urethrâ tam arctè constrictâ, incassum molitur. Hæc res, ne urina in

partes internas sese diffunderet, quippe quæ res, vix, ac ne vix quidem evitari potuit, valdè exoptanda esset. Ægroto, donec horæ quinquaginta, post injuriam acceptam, elapsæ essent, nulla erat dejectio; nihilominus, omnia Symptomata inflammatoria, die quinto minùs præterito, rebus supra memoratis, vinculis tenebantur. Urina, inter mensem dimidiatam, cursum ejus solitum capiebat, atque miserrimus, nisi quod musculi abdominis Recti, propter Sphacelum supra memoratam sese tam maximè contraxissent, ut æger vix, ac ne vix quidem, corpore erecto ambulare nequiret, atque urinam suam, vesicâ plus quam solitum est, contractâ, præter horas paucas haud retinere potuisset, penitùs convaluit. Neque dubium sit, quin Rectum nimis quoque contrahatur, nam Infelix, et Hæmorrhoe, et Diarrhæa et alvi constrictione haud rarò laborabat.

EXEMPLUM II.

Miles, vulnus supra Symphysin Pubis accepit. Glandulus plumbeus cavitationem abdominis minimè penetravit, sed Integumentorum partem, atque ossis fragmentum attrahens, in obliquum processit. Penis ab injuria vacuus erat, atque miserrimus, horis paucissimis elapsis, sese movere potuit. Omnia autem Cystitidis symptomata, systemate tunc temporis plurimum turbato, impetum demum fecerunt, atque citra horam trigesimam et octavam, quamvis ægre repulsa, essent. His rebus factis, infelix sanitate iterum gauderat.

EXEMPLUM III.

Aliud exemplum, ictu effectum, sese mihi fortè offerebat. Hic loci Sphacelus factus erat, atque miserrimus, horis septuaginta minimis elapsis, mortem subiit. Dissectio, hoc in exemplo, tum de causa proxima, tum de morbi effectibus, me certiore fecit; atque hæc brevissimè narrare, ni fallor, nostræ rei haud alienum est. Inflammatio secundum ureteres, prope ad renes cucurrisset, atque portionem vesicæ peritonealem invasisset. Quantitas vel muci, vel puris (nam mihi eadem scrutandi haud facultas erat,) minimè parva, tunicam vesicæ internam oblevit, atque nulla ejusdem pars, nisi prope ad Anum sphacelare coepisset. Glandulæ prostatæ tum amplificatio, tum Inflammatio erat; atque vesicæ cervix, et Urethra, omni ex parte, contractione tanta, tunicâ internâ tam plurimum

densatâ, ut instrumentum minimum accipere nequiret, laborabant. Tunica Recti peritonealis quoque, plurimos per digitos, inflammationem subierat, atque exuere quidem cæpisset. Fæces duratæ in curvatura Coli sigmoidea etiam repertæ erant ; atque tunicæ ejusdem, æque ac Recti, densationem tantam laborabat, et eorundum diametrum contractionem tantam perpessum esset, ut digitum vix, ac ne vix quidem accipere posset. Hoc in exemplo, tensio abdominis minor ac in aliis supra traditis erat ; atque hæc res, me judice, de urinæ quantitate minima vesicam intrantis, Ureteribus inflammatis, plurimum pende-

FINIS.